

# آریکسنت دوپیلومب

بروشور دارویی: اطلاعات مورد نیاز بیمار

آریکسنت ۲۰۰ میلی‌گرم در ۱/۱۴ میلی‌لیتر محلول تزریقی در سرنگ از پیش بر شده (۱۷۵ میلی‌گرم/ میلی‌لیتر)

دوپیلومب

لطفاً قبل از استفاده از این دارو، بروشور را با دقت مطالعه فرمایید. این بروشور حاوی اطلاعات مهم داروی شما می‌باشد.

- این بروشور را نزد خود نگه‌دارید، ممکن است مجدداً به آن نیاز پیدا کنید.
- برای دریافت اطلاعات بیشتر با پزشک، داروساز یا پرستار خود مشورت کنید.
- این دارو فقط برای شما تجویز شده است و نباید آن را به دیگران توصیه کنید؛ حتی اگر علائم مشابه بیماری شما را دارند، زیرا ممکن است برای آن‌ها مضر باشد.
- در صورت مشاهده هرگونه عوارض جانبی، حتی عوارضی که در قسمت ۴ بیان نشده است، حتماً پزشک، داروساز یا پرستار خود را مطلع کنید.

**مواردی که در این بروشور می‌خوانیم**

- ۱. آریکسنت و کاربردهای آن
- ۲. نکات مستلزم توجه قبل از استفاده از آریکسنت
- ۳. نحوه مصرف آریکسنت
- ۴. عوارض جانبی احتمالی
- ۵. شرایط مناسب برای نگهداری آریکسنت
- ۶. محتویات بسته‌بندی و سایر اطلاعات تکمیلی

## ۱ آریکسنت و کاربردهای آن

آریکسنت حاوی ماده فعال دوپیلومب است. دوپیلومب یک آنتی بادی مونوکلونال (یک نوع پروتئین اختصاصی) است که از عملکرد پروتئین‌های اینترلوکین ۱۳-۱۲-۴ و ۱۱-جولگری می‌کند. هر دوی این پروتئین‌ها نقش عمده‌ای در بروز علائم و نشانه‌های درمانی آتوپیک، آسم، آلرژیوفیلیک ازوفازیت (EoE) و کهیر مزمن خودیه خودی (CSU) دارد.

## موارد مصرف آریکسنت

## درمانیّت آتوپیک

آریکسنت برای درمان مبتلایان به درمانیّت آتوپیک متوسط تا شدید در بزرگسالان و نوجوانان (۱۲ سال و بالاتر) که واجد شرایط درمان سیستمیک هستند، استفاده می‌شود. آریکسنت همچنین برای درمان کودکان ۶ ماهه تا ۱۱ ساله مبتلا به درمانیّت آتوپیک شدید که واجد شرایط درمان سیستمیک هستند، نیز تجویز می‌شود. آریکسنت ممکن است به همراه داروهای موضعی الگزاما که روی پوست مالیده می‌شوند یا به تنهایی استفاده شود. استفاده از آریکسنت برای درمانیّت آتوپیک ازگرمای آتوپیک (می‌تواند وضعیت پوست شما را بهبود بخشد) و احساس خارش را کاهش دهد.

آریکسنت همچنین می‌تواند علائم درد، اضطراب و افسردگی مرتبط با درمانیّت آتوپیک را بهبود بخشد. علاوه بر این، آریکسنت به بهبود اختلال خواب و کیفیت کلی زندگی شما کمک می‌کند.

## آسم

آریکسنت همراه با سایر داروهای آسم به عنوان درمان نگهدارنده آسم شدید (با مشخصه التهاب نوع ۲ که با افزایش آلورژنیفیل خون و با افزایش نیتریک اکساید بازمی (FeNO) همراه است) در بزرگسالان، نوجوانان و کودکان ۶ سال و بالاتر که بیماری آن‌ها با داروهای فملی آسم شامل کورتیکواستروئیدهای استنشاقی یا دوز متوسط (برای کودکان ۶ تا ۱۱ سال) تا دوز بالا (برای کودکان و بزرگسالان) قابل کنترل نیست، استفاده می‌شود.

آریکسنت به جلوگیری از حملات شدید آسم (تشدید بیماری) کمک می‌کند و می‌تواند تنفس شما را بهبود بخشد. علاوه بر این می‌تواند در کاهش مصرف داروهای دیگری به نام کورتیکواستروئیدهای خوراکی که برای کنترل آسم خود نیاز دارید نیز کمک کننده باشد.

## آلورژنیفیلیّت ازوفازیتک (EoE)

آریکسنت برای درمان بزرگسالان، نوجوانان و کودکان ۱ ساله و بالاتر که حداقل ۱۵ کیلوگرم وزن دارند و دچار ازوفازیت آلورژنیفیلیک (EoE) هستند، استفاده می‌شود.

## کهیر خودیه‌خودی مزمن (CSU)

این دارو برای درمان کهیر خودیه‌خودی مزمن (CSU) با شدت متوسط تا شدید در بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ ساله و بالاتر که با آنتی‌هیستامین‌ها کنترل نمی‌شوند و قبلاً از داروهای مهارکننده IgE برای درمان CSU استفاده نکرده‌اند به کار می‌رود.

استفاده از آریکسنت برای درمان CSU می‌تواند با کاهش خارش و کهیر، وضعیت پوست شما را بهبود دهد.

## ۲ نکات مستلزم توجه قبل از استفاده از آریکسنت

**در موارد زیر از آریکسنت استفاده نکنید**

در صورت داشتن حساسیت به دوپیلومب یا سایر مواد جانبی در این فرآورده که در «قسمت ۶» توضیح داده شده است.

اگر فکر می‌کنید ممکن است چنین حساسیتی داشته باشید، یا مطمئن نیستید، قبل از استفاده از آریکسنت از پزشک، داروساز یا پرستار خود راهنمایی بخواهید.

## هشدارها و نکات قابل توجه

قبل از مصرف آریکسنت با پزشک، داروساز یا پرستار خود صحبت کنید:

**آریکسنت داروی مورد استفاده برای مواقع بحرانی نیست** و نباید برای درمان حمله ناگهانی آسم استفاده شود.

**واکنش‌های آلرژیک:** آریکسنت به ندرت می‌تواند عوارض جانبی جدی از جمله واکنش‌های آلرژیک (ازبید حاسبت، واکنش آنافیلاکتیک و آنژیوادم ایجاد کند. این واکنش‌ها می‌توانند از چند دقیقه تا هفته روز پس از تجویز آریکسنت رخ دهند. شما باید مراقب علائمی همچون مشکلات تنفسی، تورم صورت، لب‌ها، دهان، گلو یا زبان، ضعف و بی‌حالی شدید (غش کردن)، سرگیجه، احساس سبکی سر (فشار خون پایین)، تب، احساس خاوشی، تورم غدد لنفاوی، کهیر، خارش، درد مفاصل، راش پوستی که ممکن است در صورت مصرف آریکسنت ایجاد شود، باشید. چنین علائمی در بخش «عوارض جانبی جدی» در بخش ۴ ذکر شده است. در صورت مشاهده هرگونه علائم واکنش آلرژیک استفاده از آریکسنت را متوقف کنید و به پزشک خود اطلاع دهید یا فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنید.

**شرایط آلورژنیوفیلیی:** به ندرت بیماریاری که داروی آسم مصرف می‌کنند، ممکن است به دلیل افزایش نوع خاصی از گلبول‌های سفید (آلورژنیوفیل) دچار التهاب رگ‌های خونی یا ریه‌ها شوند. اینکه این واکنش توسط آریکسنت نیز ممکن است ایجاد گردد یا خیر هنوز مشخص نمی‌باشد.

این واکنش معمولاً، اما نه همیشه، در افرادی اتفاق می‌افتد که یک داروی استروئیدی نیز مصرف می‌کنند که دوز آن کاهش یافته یا مصرف دارو متوقف شده است. در صورت بروز ترکیبی از نشانه‌ها مانند بیماری شبه آنفلوآنزا، سوزن سوزن شدن یا بی‌حسی بازوها یا پاها، تشدید علائم رویی به همراه راش پوستی یا بروز راش پوستی به تنهایی، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

**عفونت انگلی (انگل‌های رودهای):** آریکسنت ممکن است مقاومت بدن شما را در برابر عفونت‌های ناشی از انگل تضعیف کند. اگر مبتلا به عفونت انگلی هستید، درمان باید قبل از شروع مصرف داروی آریکسنت تکمیل شود. اگر علائمی مثل اسهال، گاز معده، ناراحتی معده، مدفوع چرب و کماهی (دهیدراتاسیون) دارید که می‌توانند نشانه عفونت انگلی باشد، با پزشک خود مشورت کنید. اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که این منطقه‌ای شایع هستند یا اگر به چنین مناطقی سفر می‌کنید یا پزشک خود مشورت کنید.

**آسم:** اگر مبتلا به آسم هستید و داروهای آسم مصرف می‌کنید، بدون مشورت با پزشک، داروی آسم خود را تغییر ندهید یا آن را قطع نکنید. قبل از قطع آریکسنت یا در صورت عدم کنترل آسم یا تشدید علائم خود در طی درمان یا آریکسنت با پزشک خود مشورت کنید.

**مشکلات چشمی:** در صورت بروز هرگونه مشکل جدید مربوط به چشم یا تشدید آن، از جمله آبریزش، خارش، قرمزی و تورم، خشکی چشم، احساس وجود شن یا احساس وجود جسم خارجی در چشم، سریعاً با پزشک خود صحبت کنید.

اگر تغییرات ناگهانی را بینایی یا درد چشم قابل توجهی را تجربه کردید که برطرف نشد، فوراً با پزشک خود صحبت کنید.

## کودکان و نوجوانان

- ایمنی و فواید آریکسنت در کودکان مبتلا به درمانیّت آتوپیک زیر ۶ ماه هنوز شناخته نشده است.
- ایمنی و فواید آریکسنت در کودکان مبتلا به آسم زیر ۶ سال هنوز شناخته نشده است.
- ایمنی و فواید آریکسنت در کودکانی که دچار EoE هستند و کمتر از ۱ سال سن دارند یا وزن آن‌ها کمتر از ۱۵ کیلوگرم است، هنوز مشخص نشده است.
- ایمنی و فواید آریکسنت در کودکانی که دچار CSU هستند و کمتر از ۱۲ سال سن دارند، هنوز مشخص نشده است.

## تداخلات دارویی

در صورت موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

اگر در حال استفاده از دارویی هستید، اخیراً دارویی مصرف کرده‌اید یا ممکن است مصرف کنید. اگر اخیراً واکسن زده‌اید یا تصمیم دارید در آینده نزدیک واکسن بزنید.

## سایر داروهای آسم

دستور مصرف مربوط به سایر داروهای بیماری آسم را جز با نظر پزشک معالج خود، تغییر (کاهش یا قطع مصرف) ندهید.

این داروها (مخصوصاً داروهایی به نام کورتیکواستروئیدها) باید به تدریج قطع شوند.

تغییر شیوه مصرف باید تحت نظارت مستقیم پزشک شما انجام شود و بستگی به پاسخ بدن شما به آریکسنت دارد.

## بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید، فکر می‌کنید ممکن است باردار باشید یا قصد بارداری دارید، قبل از استفاده از این دارو یا پزشک خود مشورت کنید. اثرات این دارو در زنان باردار مشخص نیست. بنابراین بهتر است از مصرف آریکسنت در بارداری خودداری شود مگر اینکه پزشک مصرف آن را توصیه کند. اگر در حال شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید، قبل از استفاده از این دارو با پزشک خود صحبت کنید. شما و پزشکتان باید تصمیم بگیرید که آیا شیردهی به نوزاد خود را ادامه می‌دهید یا از آریکسنت استفاده می‌کنید. این دو مورد نباید همزمان با هم انجام پذیرد.

## مصرف در هنگام رانندگی و کار با ماشین‌آلات

این دارو بعید است که بر توانایی شما در رانندگی یا کار با ماشین‌آلات تأثیر بگذارد.

## هشدار برای مواد جانبی موجود در آریکسنت

این دارو حاوی کمتر از ۱ میلی‌مول سدیم (۲۳ میلی‌گرم) در هر دوز ۲۰۰ میلی‌گرم است، به بیان دیگر «فاقد سدیم» می‌باشد.

این دارو در هر دوز ۲۰۰ میلی‌گرم (۱.۱۴ میلی‌لیتر) حاوی ۲.۲۸ میلی‌گرم پلی‌سوربات ۸۰ است. پلی‌سوربات‌ها ممکن است باعث ایجاد واکنش آلرژیک شوند.

اگر شما یا فرزندانن هرگونه آلرژی شناخته‌شده‌ای دارید، به پزشک خود اطلاع دهید.

## ۳ نحوه مصرف آریکسنت

همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک یا داروساز به شما گفته است استفاده کنید. در صورت عدم اطمینان یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

## نحوه مصرف آریکسنت

آریکسنت از طریق تزریق زیر پوستی (تزریق زیر جلدی) تجویز می‌شود.

**میزان مورد نیاز آریکسنت**

پزشک شما تصمیم خواهد گرفت که کدام دوز از آریکسنت برای شما مناسب است.

**دوز توصیه شده در بزرگسالان مبتلا به درمانیّت آتوپیک**

برای بیماران مبتلا به درمانیّت آتوپیک، دوز توصیه شده آریکسنت عبارت است از:

- دوز اولیه ۶۰۰ میلی‌گرم (دو بار تزریق دوز ۳۰۰ میلی‌گرمی)
- به دنبال آن ۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان به صورت تزریق زیر جلدی تجویز می‌شود.

**دوز توصیه شده برای نوجوانان مبتلا به درمانیّت آتوپیک**

دوز توصیه شده آریکسنت برای نوجوانان (۱۲ تا ۱۷ سال) مبتلا به درمانیّت آتوپیک بر اساس وزن بدن:

وزن بدن بیمار	دوز اولیه	دوزهای بعدی (یک هفته در میان)
کمتر از ۶۰ کیلوگرم	۴۰۰ میلی‌گرم (دو بار تزریق ۲۰۰ میلی‌گرم)	۲۰۰ میلی‌گرم
۶۰ کیلوگرم یا بیشتر	۶۰۰ میلی‌گرم (دو بار تزریق ۳۰۰ میلی‌گرم)	۳۰۰ میلی‌گرم

**دوز توصیه شده در کودکان مبتلا به درمانیّت آتوپیک**

دوز توصیه شده آریکسنت برای کودکان (۶ تا ۱۱ سال) مبتلا به درمانیّت آتوپیک براساس وزن بدن:

وزن بدن بیمار	دوز اولیه	دوزهای بعدی
از ۱۵ کیلوگرم تا کمتر از ۶۰ کیلوگرم	۳۰۰ میلی‌گرم (یک تزریق ۳۰۰ میلی‌گرمی) در روز اول، به دنبال آن ۲۰۰ میلی‌گرم در روز ۱۵ مصرف می‌شود.	۳۰۰ میلی‌گرم هر ۴ هفته یکبار* که شروع آن ۴ هفته پس از دوز روز ۱۵ می‌باشد.
۶۰ کیلوگرم یا بیشتر	۶۰۰ میلی‌گرم (دو بار تزریق ۳۰۰ میلی‌گرم)	۳۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان

\* بر اساس نظر پزشک دوز ممکن است به ۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان افزایش یابد.

**دوز توصیه شده در کودکان ۶ ماهه تا ۵ ساله مبتلا به درمانیّت آتوپیک**

دوز توصیه شده آریکسنت برای کودکان ۶ ماه تا ۵ سال مبتلا به درمانیّت آتوپیک براساس وزن بدن است:

وزن بدن بیمار	دوز اولیه	دوزهای بعدی
۵ کیلوگرم تا کمتر از ۱۵ کیلوگرم	۲۰۰ میلی‌گرم (یک تزریق ۲۰۰ میلی‌گرمی)	۲۰۰ میلی‌گرم هر ۴ هفته یکبار
۱۵ کیلوگرم تا کمتر از ۳۰ کیلوگرم	۳۰۰ میلی‌گرم (یک تزریق ۳۰۰ میلی‌گرمی)	۳۰۰ میلی‌گرم هر ۴ هفته یکبار

دوپیلومب را می‌توان با یا بدون کورتیکواستروئیدهای موضعی استفاده کرد. از مهارکننده‌های موضعی کلسی‌تروپین نیز ممکن است استفاده شود اما تنها در شرایطی که نواحی حساس و نازک پوست مانند صورت، گرن، نواحی دارای چین و ناحیه تناسلی درگیر باشند.

در بیماریاری که پس از ۱۶ هفته درمان برای درمانیّت آتوپیک هیچ پاسخی نشان نداده‌اند، باید قطع درمان در نظر گرفته شود. برخی از بیماران با پاسخ نسبی اولیه ممکن است متعاقباً با ادامه درمان بیش از ۱۶ هفته بهبود پیدا کنند. در صورتی که قطع درمان با دوپیلومب ضرورت داشته باشد، بیماران همچنان می‌توانند با موفقیت مجدداً درمان را شروع کنند.

**دوز توصیه شده در بزرگسالان و نوجوانان مبتلا به آسم (۱۲ سال و بالاتر)**

برای بیماران مبتلا به آسم شدید و کسانی که از کورتیکواستروئیدهای خوراکی استفاده می‌کنند برای بیماران مبتلا به آسم شدید که همزمان مبتلا به درمانیّت آتوپیک متوسط تا شدید و یا مبتلا به رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی (بزرگسالان) بوده، دوز توصیه شده آریکسنت عبارت است از:

- دوز اولیه ۶۰۰ میلی‌گرم (دو بار تزریق ۳۰۰ میلی‌گرم)
- به دنبال آن ۳۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان به صورت تزریق زیر جلدی تجویز می‌شود.
- برای سایر بیماران مبتلا به آسم شدید، دوز توصیه شده آریکسنت عبارت است از:
- دوز اولیه ۴۰۰ میلی‌گرم (دو بار تزریق ۲۰۰ میلی‌گرم)
- به دنبال آن ۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان به صورت تزریق زیر جلدی تجویز می‌شود.

**دوز توصیه شده در کودکان مبتلا به آسم**

دوز توصیه شده آریکسنت برای کودکان (۶ تا ۱۱ سال) مبتلا به آسم بر اساس وزن بدن:

وزن بدن بیمار	دوز اولیه و دوزهای بعدی
۱۵ کیلوگرم تا کمتر از ۳۰ کیلوگرم	۳۰۰ میلی‌گرم هر ۴ هفته یکبار
۳۰ کیلوگرم تا کمتر از ۶۰ کیلوگرم	۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان یا ۳۰۰ میلی‌گرم هر ۴ هفته یکبار
۶۰ کیلوگرم یا بیشتر	۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان

برای بیماران یا سن ۶ تا ۱۱ سال مبتلا به آسم و درمانیّت آتوپیک شدید به‌طور همزمان، پزشک تصمیم می‌گیرد که کدام دوز آریکسنت مناسب است.

بیمارانی که همزمان کورتیکواستروئیدهای خوراکی دریافت می‌کنند، ممکن است پس از بهبود بالینی با دوپیلومب، دوز استروئید خود را کاهش دهند. کاهش استروئید باید به تدریج انجام شود. دوپیلومب برای درمان طولانی مدت در نظر گرفته شده است. بررسی نیاز به ادامه درمان باید حداقل به صورت سالانه در نظر گرفته شود که توسط ارزیابی پزشکی از میزان کنترل آسم بیمار تعیین می‌شود.

**دوز توصیه‌شده برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان ۱ ساله و بالاتر مبتلا به ازوفازیت آلورژنیوفیلیک (EoE)**

وزن بدن بیمار	دوز اولیه
از ۱۵ کیلوگرم تا کمتر از ۳۰ کیلوگرم	۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان
از ۳۰ کیلوگرم تا کمتر از ۴۰ کیلوگرم	۳۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان
۴۰ کیلوگرم یا بیشتر	۳۰۰ میلی‌گرم هر هفته

**دوز توصیه‌شده در بزرگسالان مبتلا به کهیر خودیه‌خودی مزمن (CSU)**

دوز توصیه‌شده آریکسنت برای بیماران بزرگسال شامل یک دوز اولیه ۶۰۰ میلی‌گرمی (دو تزریق ۳۰۰ میلی‌گرمی) است و سپس ۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان تزریق می‌شود.

**دوز توصیه‌شده در نوجوانان مبتلا به کهیر خودیه‌خودی مزمن (CSU)**

دوز توصیه‌شده آریکسنت برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال مبتلا به کهیر خودیه‌خودی مزمن بر اساس وزن بدن تعیین می‌شود:

وزن بدن بیمار	دوز اولیه	تزریق‌های بعدی (یک هفته در میان)
۳۰ تا کمتر از ۶۰ کیلوگرم	۴۰۰ میلی‌گرم (دو تزریق ۲۰۰ میلی‌گرم)	۲۰۰ میلی‌گرم یک هفته درمیان
۶۰ کیلوگرم و بالاتر	۶۰۰ میلی‌گرم (دو تزریق ۳۰۰ میلی‌گرم)	۳۰۰ میلی‌گرم یک هفته در میان

## تزریق آریکسنت

آریکسنت به روش تزریق زیر پوست (تزریق زیر جلدی) برای شما تجویز می‌شود. شما و پزشک یا پرستارتان باید تصمیم بگیرید که آیا خودتان آریکسنت را تزریق کنید یا خیر.

قبل از اینکه خودتان آریکسنت را تزریق کنید، باید توسط پزشک یا پرستار خود به طور مناسب آموزش دیده باشید. تزریق آریکسنت ممکن است پس از آموزش مناسب توسط پزشک یا پرستار، توسط فرد دیگری که از شما مراقبت می‌کند برایتان انجام شود. هر سرنگ از پیش بر شده حاوی یک دوز آریکسنت است. سرنگ از پیش بر شده را نکان ندهید.

قبل از استفاده از آریکسنت، «دستورالعمل استفاده» را برای سرنگ از پیش بر شده به دقت بخوانید.

**در صورتی که بیشتر از مقدار توصیه شده آریکسنت تزریق کرده‌اید**

اگر بیش از حد مجاز آریکسنت استفاده کرده‌اید یا دوز آن زودتر از موعد برای شما تزریق شده است، با پزشک، داروساز یا پرستار خود صحبت کنید.

**در صورتی که تزریق دوز آریکسنت را فراموش کرده‌اید**

اگر فراموش کرده‌اید که یک دوز آریکسنت را تزریق کنید، با پزشک، داروساز یا پرستار خود صحبت کنید.

اگر برنامه دوز شما هر هفته است و یک دوز از آریکسنت را فراموش کرده‌اید:

در اسرع وقت تزریق آریکسنت را انجام دهید و از زمانی که به خاطر آوردید آریکسنت را مصرف کنید، یک برنامه دوز جدید در هفته را شروع کنید.

اگر برنامه دوز شما یک هفته در میان است و یک دوز از آریکسنت را فراموش کرده‌اید:

- تزریق آریکسنت را ظرف ۷ روز پس از دوز فراموش‌شده انجام دهید، سپس به برنامه اولیه خود ادامه دهید.

اگر دوز فراموش شده ظرف ۷ روز داده نشد، تا نوبت بعدی برنامه ریزی شده صبر کنید تا آریکسنت تزریق شود.

اگر برنامه دوز شما هر ۴ هفته است و یک دوز آریکسنت را فراموش کرده‌اید:

تزریق آریکسنت را ظرف ۷ روز پس از دوز فراموش شده انجام دهید، سپس به برنامه اولیه خود ادامه دهید.

اگر دوز فراموش شده ظرف ۷ روز داده نشد، از زمانی که به خاطر آوردید آریکسنت خود را مصرف کنید، یک برنامه دوز جدید هر ۴ هفته یکبار شروع کنید.

## قطع خودسرانه مصرف آریکسنت

استفاده از آریکسنت را بدون مشورت با پزشک خود قطع نکنید.

در صورت داشتن هرگونه سوال بیشتر در مورد استفاده از این دارو، از پزشک، داروساز یا پرستار خود بپرسید.

## ۴ عوارض جانبی احتمالی

مانند تمامی داروها، این دارو نیز می‌تواند باعث ایجاد عوارض جانبی گردد. اگرچه عوارض جانبی در تمامی افراد دیده نمی‌شود.

آریکسنت می‌تواند عوارض جانبی جدی، از جمله واکنش‌های آلرژیک نادر (ازبید حساسیّت) شامل واکنش آنافیلاکتیک، واکنش بیماری سرم و واکنش شبه بیماری سرم ایجاد کند. علائم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- مشکلات تنفسی
- تورم صورت، لب‌ها، دهان، گلو یا زبان (آنژیوادم)
- ضعف و بی‌حالی مغرط (غش کردن)، سر گیجه، احساس سبکی سر (فشار خون پایین)
- تب

- احساس ناخوشی عمومی
- تورم غدد لنفاوی
- کهیر
- خارش
- درد مفاصل
- راش پوستی

در صورت بروز واکنش آلرژیک، مصرف آریکسنت را متوقف کرده و فوراً با پزشک خود مشورت کنید.

**عوارض جانبی دارو به ترتیب تناوب بروز عبارت‌ند از:**

**عوارض جانبی شایع (بروز عارضه در یک نفر از ده نفر)**

واکنش‌های محل تزریق (به عنوان مثال قرمزی، تورم، خارش، درد، کبودی)

- قرمزی و خارش چشم
- غفونت چشم
- تبخال (تورخ لب و پوست)
- درد مفاصل (آرترالژی)
- افزایش نوع خاصی از گلبول‌های سفید خون (آلورژنیوفیل)

**عوارض جانبی ناشایع (بروز عارضه در یک نفر از صد نفر)**

- تورم صورت، لب‌ها، دهان، گلو یا زبان (آنژیوادم)
- خارش، قرمزی و تورم پلک \*
- التهاب سطح چشم، گاهی همراه با تاری دید (التهاب قرنیه چشم)
- راش یا قرمزی صورت
- خشکی چشم \*

\* این عوارض جانبی مرتبط با چشم در بیماران مبتلا به درمانیّت آتوپیک شایع می‌باشد (بروز عارضه در یک نفر از ده نفر).

**عوارض جانبی نادر (بروز عارضه در یک نفر از هزار نفر)**

زخم در لبه شفاف بیرونی چشم، گاهی اوقات همراه با تاری دید \*کراتیت اولسراتیو (زخم و التهاب قرنیه چشم)\*

- واکنش‌های آلرژیک جدی (ازبید حساسیّت)

\* عارضه جانبی «کراتیت اولسراتیو (زخم و التهاب قرنیه چشم)» در بیماران مبتلا به درمانیّت آتوپیک ناشایع می‌باشد (بروز عارضه در یک نفر از صد نفر).

**عوارض جانبی افزوده شده در کودکان ۶ تا ۱۱ سال مبتلا به آسم**

شایع: کریمک (تورتیواریس)

## گزارش عوارض جانبی

در صورت مشاهده هرگونه عوارض جانبی، حتی عوارضی که در این بروشور ذکر نشده است، حتماً پزشک، داروساز یا پرستار خود را مطلع نمایید. با گزارش عوارض جانبی شما می‌توانید به تکمیل اطلاعات مربوط به ایمنی این دارو کمک کنید. شما همین‌طور می‌توانید عوارض جانبی را مستقیماً از طریق وب سایت وزارت بهداشت **fdagov.ir** یا شماره **۲۴۵۹۲۱-۲۱** ثبت نمایید.

## ۵ شرایط مناسب برای نگهداری آریکسنت

این دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای آن که بر روی جعبه و سرنگ حاوی محلول آماده تزریق بعد از «EXP» درج شده است، مصرف نکنید. تاریخ انقضاء همیشه آخرین روز ماه ذکر شده است.

دارو را در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد (دمای یخچال) نگهداری نمایید. از یخ‌زدگی محافظت شود.

جهت محافظت از نور، سرنگ دارو را داخل جعبه اصلی دارو نگهداری نمایید.

تحت هیچ شرایطی سرنگ آریکسنت را محکم تکان ندهید.

دارو را به هیچ وجه گرم نکنید.

سرنگ را در مقابل نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.

# Aryxent

## Dupilumab

Package leaflet: Information for the patient  
Aryxent 200 mg in 1.14 ml solution for injection in pre-filled syringe (175 mg/ml)  
Dupilumab

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

Keep this leaflet. You may need to read it again.

- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

### What is in this leaflet:

1. What Aryxent is and what it is used for
2. What you need to know before you use Aryxent
3. How to use Aryxent
4. Possible side effects
5. How to store Aryxent
6. Contents of the pack and other information

### 1 What Aryxent is and what it is used for

Aryxent contains the active substance dupilumab. Dupilumab is a monoclonal antibody (a type of specialized protein) that blocks the action of proteins called interleukins (IL-4 and IL-13). Both play a major role in causing the signs and symptoms of atopic dermatitis, asthma, eosinophilic esophagitis (EoE), and chronic spontaneous urticaria (CSU).

### What Aryxent is used for

#### Atopic dermatitis

Aryxent is used to treat adults and adolescents 12 years and older with moderate-to-severe atopic dermatitis, also known as atopic eczema, who are candidates for systemic therapy. Aryxent is also used to treat children 6 months to 11 years old with severe atopic dermatitis who are candidates for systemic therapy.

Aryxent may be used with eczema medicines that you apply to the skin or it may be used on its own.

Using Aryxent for atopic dermatitis (atopic eczema) can improve the condition of your skin and reduce itching. Aryxent has also been shown to improve symptoms of pain, anxiety, and depression associated with atopic dermatitis. In addition, Aryxent helps improve your sleep disturbance and overall quality of life.

#### Asthma

Aryxent is used with other asthma medicines for the maintenance treatment of severe asthma with type 2 inflammation characterised by raised blood eosinophils and/or raised fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) in adults, adolescents, and children aged 6 years and older whose asthma is not controlled with their current asthma medicines including medium (for Children 6 to 11 years of age) to high (for children and adults) dose inhaled corticosteroids.

Aryxent helps prevent severe asthma attacks (exacerbations) and can improve your breathing.

Aryxent may also help reduce the amount of another group of medicines you need to control your asthma, called oral corticosteroids, while preventing severe asthma attacks and improving your breathing.

#### Eosinophilic esophagitis (EoE)

Aryxent is used to treat adults, adolescents and children 1 year and older, weighing at least 15 kg with eosinophilic esophagitis (EoE).

#### Chronic spontaneous urticaria (CSU):

Aryxent is used to treat adults and adolescents 12 years and older with moderate to severe chronic spontaneous urticaria (CSU) not controlled with antihistamines who have not received immunoglobulin E (IgE) blockers for their CSU.

Using Aryxent for CSU can improve the condition of your skin by reducing itch and hives.

### 2 What you need to know before you use Aryxent

#### Do not use Aryxent

- If you are allergic to dupilumab or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

If you think you may be allergic, or you are not sure, ask your doctor, pharmacist or nurse for advice before using Aryxent.

#### Warnings and precautions

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before using Aryxent:

- Aryxent is **not a rescue medicine** and should not be used to treat a sudden asthma attack.

**Allergic reactions:** Rarely, Aryxent can cause serious side effects, including allergic (hypersensitivity) reactions and anaphylactic reaction and angioedema.

These reactions can occur from minutes until seven days after Aryxent administration. You must look out for signs of these conditions (i.e. breathing problems, swelling of the face, lips, mouth, throat or tongue, fainting, dizziness, feeling lightheaded (low blood pressure), fever, general ill feeling, swollen lymph nodes, hives, itching, joint pain, skin rash) while you are taking Aryxent. Such signs are listed under “Serious side effects” in section 4. Stop using Aryxent and tell your doctor or get medical help immediately if you notice any signs of an allergic reaction.

**Eosinophilic conditions:** Rarely patients taking an asthma medicine may develop inflammation of blood vessels or lungs due to an increase of certain white blood cells (eosinophilia). It is not known whether this is caused by Aryxent. This usually, but not always, happens in people who also take a steroid medicine which is being stopped or for which the dose is being lowered. Tell your doctor immediately if you develop a combination of symptoms such as a flu-like illness, pins and needles or numbness of arms or legs, worsening of pulmonary symptoms, and/or rash.

**Parasitic (intestinal parasites) infection:** Aryxent may weaken your resistance to infections caused by parasites. If you already have a parasitic infection it should be treated before you start treatment with Aryxent.

Check with your doctor if you have diarrhoea, gas, upset stomach, greasy stools, and dehydration which could be a sign of a parasitic infection. If you live in a region where these infections are common or if you are travelling to such a region check with your doctor.

**Asthma:** If you have asthma and are taking asthma medicines, do not change or stop your asthma medicine without talking to your doctor. Talk to your doctor before you stop Aryxent or if your asthma remains uncontrolled or worsens during treatment with this medicine.

**Eye problems:** Talk to your doctor promptly if you have any new or worsening eye problems. These may include watering, itching, redness and swelling, eye dryness, a feeling of gritty eyes or a sensation of a foreign body in the eye. If you experience sudden changes in vision or significant eye pain that does not settle, speak to your doctor straight away.

#### Children and adolescents

- The safety and benefits of Aryxent are not yet known in children with atopic dermatitis below the age of 6 months.
- The safety and benefits of Aryxent are not yet known in children with asthma below the age of 6 years.
- The safety and benefits of Aryxent are not yet known in children with EoE below the age of 1 year, or with a body weight < 15 kg
- The safety and benefits of Aryxent are not yet known in children with CSU below the age of 12 years.

#### Other medicines and Aryxent

Tell your doctor or pharmacist

- If you are using, have recently used or might use any other medicines.
- If you have recently had or are due to have a vaccination.

#### Other medicines for asthma

Do not stop or reduce your asthma medicines, unless instructed by your doctor.

- These medicines (especially ones called corticosteroids) must be stopped gradually.
- This must be done under the direct supervision of your doctor and dependent on your response to Aryxent.

#### Pregnancy and breast-feeding

- If you are pregnant, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor for advice before using this medicine. The effects of this medicine in pregnant women are not known; therefore, it is preferable to avoid the use of Aryxent in pregnancy unless your doctor advises to use it.
- If you are breast-feeding or are planning to breast-feed, talk to your doctor before using this medicine. You and your doctor should decide if you will breast-feed or use Aryxent. You should not do both.

#### Driving and using machines

Aryxent is unlikely to influence your ability to drive and use machines.

#### Excipients warning

- This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 200 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”.
- This medicine contains 2.28 mg of polysorbate 80 in each 200 mg dose (1.14 mL). Polysorbates may cause allergic reactions. Tell your doctor if you have or your child has any known allergies.

### 3 How to use Aryxent

Always use this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

#### How Aryxent is given

Aryxent is given by injection under the skin (subcutaneous injection).

#### How much Aryxent you will receive

Your doctor will decide which dose of Aryxent is right for you.

#### Recommended dose in adults with atopic dermatitis

For patients with atopic dermatitis, the recommended dose of Aryxent is:

- An initial dose of 600 mg (two 300 mg injections)
- Followed by 300 mg given every other week by subcutaneous injection.

#### Recommended dose in adolescents with atopic dermatitis

The recommended dose of Aryxent for adolescents (12 to 17 years of age) with atopic dermatitis is based on body weight:

Body Weight of Patient	Initial Dose	Subsequent Doses (every other week)
less than 60 kg	400 mg (two 200 mg injections)	200 mg
60 kg or more	600 mg (two 300 mg injections)	300 mg

#### Recommended dose in children with atopic dermatitis

The recommended dose of Aryxent for children (6 to 11 years of age) with atopic dermatitis is based on body weight:

Body Weight of Patient	Initial Dose	Subsequent Doses
15 kg to less than 60 kg	300 mg (one 300 mg injection) on Day 1, followed by 300 mg on Day 15	300 mg every 4 weeks*, starting 4 weeks after Day 15 dose
60 kg or more	600 mg (two 300 mg injections)	300 mg every other week

\* The dose may be increased to 200 mg every other week based on the doctor's opinion.

#### Recommended dose in children 6 months to 5 years of age with atopic dermatitis

The recommended dose of Aryxent for children 6 months to 5 years of age with atopic dermatitis is based on body weight:

Body Weight of Patient	Initial Dose	Subsequent Doses
5 kg to less than 15 kg	200 mg (one 200 mg injection)	200 mg every 4 weeks
15 kg to less than 30 kg	300 mg (one 300 mg injection)	300 mg every 4 weeks

Dupilumab can be used with or without topical corticosteroids. Topical calcineurin inhibitors may be used, but should be reserved for problem areas only, such as the face, neck, intertriginous and genital areas.

Consideration should be given to discontinuing treatment in patients who have shown no response after 16 weeks of treatment for atopic dermatitis. Some patients with initial partial response may subsequently improve with continued treatment beyond 16 weeks. If dupilumab treatment interruption becomes necessary, patients can still be successfully re-treated.

#### Recommended dose in adult and adolescent patients with asthma (12 years of age and older)

For patients with severe asthma and who are on oral corticosteroids or for patients with severe asthma and co-morbid moderate-to-severe atopic dermatitis or adults with co-morbid severe chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, the recommended dose of Aryxent is:

- An initial dose of 600 mg (two 300 mg injections)
- Followed by 300 mg given every other week administered as subcutaneous injection.

For all other patients with severe asthma, the recommended dose of Aryxent is:

- An initial dose of 400 mg (two 200 mg injections)
- Followed by 200 mg given every other week administered as subcutaneous injection.

#### Recommended dose in children with asthma

The recommended dose of Aryxent for children (6 to 11 years of age) with asthma is based on body weight:

Body Weight of Patient	Initial and Subsequent Doses
15 kg to less than 30 kg	300 mg every 4 weeks
30 kg to less than 60 kg	200 mg every other week or 300 mg every 4 weeks
60 kg or more	200 mg every other week

For patients 6 to 11 years old with asthma and coexisting severe atopic dermatitis, your doctor will decide which dose of Aryxent is right for you.

Patients receiving concomitant oral corticosteroids may reduce their steroid dose once clinical improvement with dupilumab has occurred. Steroid reductions should be accomplished gradually.

Dupilumab is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient's level of asthma control.

#### Recommended dose in adults, adolescents and children (1 year of age and older) with eosinophilic esophagitis (EoE)

Body Weight	Dose
15 to less than 30 kg	200 mg every other week
30 to less than 40 kg	300 mg every other week
40 kg or more	300 mg every week

#### Recommended dose in adults with chronic spontaneous urticaria (CSU)

The recommended dose of Dupixent for adult patients is an initial dose of 600 mg (two 300 mg injections), followed by 300 mg given every other week.

#### Recommended dose in adolescents with chronic spontaneous urticaria (CSU):

The recommended dose of Dupixent for adolescents (12 to 17 years of age) with chronic spontaneous urticaria is based on body weight:

Body Weight of Patient	Initial Dose	Subsequent Doses (every other week)
30 to less than 60 kg	400 mg (two 200 mg injections)	200 mg every other week (Q2W)
60 kg or more	600 mg (two 300 mg injections)	300 mg every other week (Q2W)

#### Injecting Aryxent

Aryxent is given by injection under your skin (subcutaneous injection). You and your doctor or nurse should decide if you should inject Aryxent yourself.

Before injecting Aryxent yourself you must have been properly trained by your doctor or nurse. Your Aryxent injection may also be given by a caregiver after proper training by a doctor or nurse.

Each pre-filled syringe contains one dose of Aryxent. Do not shake the pre-filled syringe.

Read the “Instructions for Use” for the pre-filled syringe carefully before using Aryxent.

#### If you use more Aryxent than you should

If you use more Aryxent than you should or the dose has been given too early, talk to your doctor, pharmacist or nurse.

#### If you forget to use Aryxent

If you have forgotten to inject a dose of Aryxent, talk to your doctor, pharmacist or nurse.

If your dose schedule is **every week** and you miss a dose of Aryxent:

- Give the Aryxent injection as soon as possible and start a new every week dose schedule from the time you remember to take your Aryxent injection.

If your dose schedule is **every other week** and you miss a dose of Aryxent:

- Give the Aryxent injection within 7 days from the missed dose, then continue with your original schedule.
- If the missed dose is not given within 7 days, wait until the next scheduled dose to give your Aryxent injection.

If your dose schedule is **every 4 weeks** and you miss a dose of Aryxent:

- Give the Aryxent injection within 7 days from the missed dose, then continue with your original schedule.
- If the missed dose is not given within 7 days, start a new every 4 week dose schedule from the time you remember to take your Aryxent injection.

#### If you stop using Aryxent

Do not stop using Aryxent without speaking to your doctor first.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.

### 4 Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Aryxent can cause serious side effects, including rare allergic (hypersensitivity) reactions, including anaphylactic reaction, serum sickness reaction, serum sickness-like reaction; the signs may include:

- Breathing problems
- Swelling of the face, lips, mouth, throat or tongue (angioedema)
- Fainting, dizziness, feeling lightheaded (low blood pressure)

- Fever
- General ill feeling
- Swollen lymph nodes
- Hives
- Itching
- Joint pain

- Skin rash

If you develop an allergic reaction, stop using Aryxent and talk to your doctor right away.

#### Other side effects

#### Common (may affect up to 1 in 10 people)

- Injection site reactions (i.e. redness, swelling, itching, pain, bruising)
- Eye redness and itching
- Eye infection
- Cold sores (on lips and skin)
- Joint pain (arthralgia)
- An increase in a certain kind of white blood cell (eosinophils)

#### Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)

- Swelling of the face, lips, mouth, throat or tongue (angioedema)
- Eyelid itching, redness and swelling\*
- Inflammation of the eye surface, sometimes with blurred vision (keratitis)
- Facial rash or redness
- eye dryness\*

\* These eye side effects were common (up to 1 in 10 people) in patients with atopic dermatitis

#### Rare (may affect up to 1 in 1,000 people)

- Ulcers on the outer clear layer of the eye, sometimes with blurred vision (ulcerative keratitis)\*
- serious allergic (hypersensitivity) reactions

\* The side effect of ulcerative keratitis was uncommon (up to 1 in 100 people) in patients with atopic dermatitis

#### Additional side effects in children 6 to 11 years old with asthma

Common: pinworms (enterobiasis)

#### Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

You can also report side effects directly via the national reporting system [fdagov.ir](http://fdagov.ir) or calling +98-021-42593 OrchidLife. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

### 5 How to store Aryxent

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the label and carton after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.
- Store in a refrigerator (2-8° C). Do not freeze.
- Store in the original carton to protect from light.
- Do not use this medicine if you notice that the medicine is cloudy, discoloured, or has particles in it.
- Do not shake the syringe at any time.
- Do not heat the syringe.
- Do not place the syringe into direct sunlight.
- Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your doctor, pharmacist or nurse how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

### 6 Contents of the pack and other information

#### What Aryxent contains

The active substance is dupilumab. Each pre-filled syringe contains 200 mg of dupilumab in 1.14 ml solution for injection. (175 mg/ml)

The other ingredients are Arginine hydrochloride, Histidine, Polysorbate 80, Sodium acetate (trihydrate), Sucrose, Water for injections.

#### What Aryxent looks like and contents of the pack

Aryxent is a clear to slightly opalescent, colourless to pale yellow solution supplied in a pre-filled syringe.

Each small box contains one 200 mg pre-filled syringe.

#### Instructions for use

#### Important information

This device is a single-use pre-filled syringe. It contains 200 mg of Aryxent for injection under the skin (subcutaneous injection).

You must not try to give yourself or someone else the injection unless you have received training from your healthcare professional. In adolescents 12 years and older, it is recommended that Aryxent be administered by or under supervision of an adult. In children less than 12 years of age, Aryxent should be given by a caregiver.

- Read all of the instructions carefully before using the syringe.
- Check with your healthcare professional how often you will need to inject the medicine.
- Ask your healthcare professional to show you the right way to use the syringe before you inject for the first time.
- Change the injection site for each injection.
- **Do not use** the syringe if it has been dropped on a hard surface or damaged.
- **Do not use** the syringe if the needle cap is missing or not securely attached.
- **Do not touch** the plunger rod until you are ready to inject.
- **Do not inject** through clothes.
- **Do not get rid** of any air bubbles in the syringe.
- **Never pull back** on the plunger rod.
- **Do not re-use** the syringe.

#### Step 1: Setting up for an injection

- Remove the syringe from the carton by holding the middle of the syringe body.
- Do not pull off the needle cap until you are ready to inject.
- Do not use the syringe if it has been dropped on a hard surface or damaged.
- Assemble the additional supplies you will need for your injection. These include alcohol swab and a cotton ball or gauze.
- Check the expiry date. Do not use the syringe if the expiry date has passed.
- Check that you have the correct product and dose.
- Look at the medicine through the viewing window on the syringe. Check if the liquid is clear and colourless to pale yellow. You may see an air bubble; this is normal. Do not use the syringe if the liquid is discoloured or cloudy, or if it contains flakes or particles.
- Lay the syringe on a flat surface for at least 45 minutes and let it get to room temperature naturally.
- Do not warm Aryxent in any other way (for example, do not warm it in a microwave or in hot water).
- Do not place the syringe in direct sunlight.

#### Step 2: Choosing an injection site

- The three recommended injection sites for Aryxent using a pre-filled syringe include: the front of the thighs; the abdomen (except for the 5 cm area right around the navel); and upper arm. If you are self injecting, you should not use the arms.
- Change the injection site for each injection.
- Do not inject into skin that is tender, amaged or has bruises or scars.

#### Step 3: Injecting Aryxent

- Wash your hands.
- Clean the injection site with an alcohol wipe. Let your skin dry before injecting.
- Do not touch the injection site again or blow on it before the injection.
- Hold the syringe in the middle of the syringe body with the needle pointing away from you and pull off the needle cap.
- Do not put the needle cap back on.
- Do not touch the needle. Inject your medicine immediately after removing the needle cap.
- Pinch a fold of skin at the injection site, as shown in the picture.
- Insert the needle completely into the fold of skin at roughly a 45° angle.
- Relax the pinch. Push the plunger rod down slowly and steadily as far as it will go until the syringe is empty.
- Note: You will feel some resistance This is normal.
- After injection pull the needle out of the skin with the same angle as inserted.
- Lightly press a cotton ball or gauze on the injection site if you see any blood. Do not rub your skin after the injection.
- Do not put the needle cap back on.

#### Step 4: Disposing of supplies

Avoid reusing the syringe after using it, put it in the waste for sharp objects and avoid throwing it away in the household waste. If for any reason the injection is not successful, call your doctor, pharmacist or patient support unit (24 hours) Orchid Life as soon as possible at +98-21-42593.

Remember that the pre-filled syringe is designed for easy injection by yourself, but ask your doctor, pharmacist or nurse for the first injection. You can also visit one of the OrchidLife centers for free injection training.

	<b>Manufactured by AryoGen Pharmed</b> Alborz, Iran. Zip code: 3164819711 Tel.: +98 26 361 06480-4 Fax: +98 26 361 06464 Email: <a href="mailto:contact@aryogen.com">contact@aryogen.com</a> Patient's support (24 hours): +98-21-42593
---	---