





آماده سازی دارو جهت انفوزیون



شکل دارویی و شرایط نگهداری

- ویال آریوتراست حاوی ۱۵۰ میلی گرم پودر لیوفیلیزه
- ویال آریوتراست حاوی ۴۴۰ میلی گرم پودر لیوفیلیزه به همراه آب باکتریواستاتیک قابل تزریق حاوی بنزیل الکل
- نگهداری در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد (در یخچال)
- حفاظت از یخ زدگی دارو
- حفاظت از نور



تجویز دارو

- نحوه تزریق داروی آریوتراست: انفوزیون وریدی
- عدم تزریق به صورت بولوس یا پوش
- مدت زمان انفوزیون اول داروی آریوتراست: ۹۰ دقیقه
- مدت زمان انفوزیون در دوزهای بعدی ۹۰-۳۰ دقیقه

آریوتراست در بیماران مبتلا به مشکلات ریوی

- باید با احتیاط مصرف شود (شانس بروز سمیت تنفسی بیشتر است).
- سمیت ریوی در طی تجویز دارو و نیز تا ۲۴ ساعت بعد از آن وجود دارد.
- واکنش‌های تأخیری نیز گزارش شده است.

به موارد زیر دقت نمایید

در حین آماده سازی محلول

- از تکان دادن شدید ویال خودداری نمایید.
- در صورت ایجاد کف بر روی سطح ترکیب، ویال به مدت ۵ دقیقه به حال خود رها شود.
- محلول باید بدون رنگ و یا زرد کم رنگ باشد.

در حین رقیق سازی محلول

- انجام رقیق سازی در شرایط آسپتیک
- جهت مخلوط کردن محلول، به آرامی سرم را سر و ته کنید.
- عدم رقیق سازی در سرم حاوی گلوکز (D/W 5%)

ملاحظات حین انفوزیون


- اکثر واکنش‌های حین انفوزیون در طی ۲۴ ساعت اول از اولین انفوزیون رخ می‌دهد.
- بیمار بایستی از جهت بروز علائم واکنش‌های حین انفوزیون مورد بررسی قرار گیرد.
- داروهایی که جهت کنترل واکنش‌های حین انفوزیون توصیه می‌گردد:
- استامینوفن خوراکی با دوز ۶۵۰ میلی گرم
- دیفن هیدرامین خوراکی با دوز ۵۰ میلی گرم
- مپریدین (بتیدین)

مدیریت واکنش‌های حین انفوزیون


- واکنش‌های ملایم تا متوسط: کاهش سرعت انفوزیون
- دیس پنه، افت فشار خون مشخص: قطع موقتی انفوزیون
- واکنش‌های شدید و تهدید کننده حیات (آنژیوادم و آنافیلاکسی): قطع مصرف دارو

پارامترها جهت مانیتورینگ قلبی طی انفوزیون

- تراستوزومب می‌تواند به صورت علامت دار یا بدون علامت سبب کاهش برون ده بطن چپ و نارسایی قلبی شود به ویژه در بیمارانی که رژیم‌های حاوی آنتراسیکلین‌ها را دریافت می‌کنند.
- میزان برون ده بطن چپ (LVEF) در شروع درمان، سپس هر ۳ ماه یک بار تا کامل شدن دوره درمانی بایستی بررسی شود. در صورتی که دارو به صورت ادجوانت مصرف می‌شود، هر ۶ ماه برای حداقل ۲ سال مانیتور شود.
- در صورت بروز کاردیومیوپاتی دارو باید قطع شود. این عارضه دارو معمولاً طی ۱ تا ۳ ماه برطرف می‌گردد.



ARYOGEN
آریوژن فارمد



OrchidLife™
Your Trust, Our Care

واحد حمایت از
بیمار ارکیدلایف:
۰۲۱-۴۲۵۹۳